

(平不余)

本報特別啓事

嘉興張幼勤君問

所 中 國 醫 學 院	室 上 海 北 四 川 路 百 廿 五 號 路 旁 總 發 行	館 上 海 西 路 二 百 廿 五 號 路 旁 總 發 行	浙 江 路 清 和 對 面 中 國 醫 藥 學 院 附 屬 藥 房	外 埠 函 購 郵 費 在 內 一 律 不 加	瓶 二 十 片 每 日 服 五 次 開 水 送 下	少 壯 進 治 肺 癆 面 色 萎 黃 等 症 服 之 開 水 送 下	補 益 得 本 藥 之 功 效 咳 嗽 痰 喘 氣 促 等 症 服 之 開 水 送 下	易 得 本 藥 之 功 效 咳 嗽 痰 喘 氣 促 等 症 服 之 開 水 送 下	固 本 防 癆 良 方 之 功 效 咳 嗽 痰 喘 氣 促 等 症 服 之 開 水 送 下	殺 菌 無 功 之 功 效 咳 嗽 痰 喘 氣 促 等 症 服 之 開 水 送 下
----------------------------	--	---	---	--	---	--	--	---	---	---

藥經西、西方或、等耳肉、也粉、有、麻養、氣國地改有我執無失物潮
部理、須用、爲將有目橫穢、尤此其煩需一藥方、良數國兀踴、之自
主上此情、或丸我威中藥士於猶如多次、時或藥試、因藥、於類用我
任澤同登務改、國於、哉卒是如昔因如尤、失少、問字、物將中足途國
巴中人以求爲靈藥此固、勇換今日、藥其倉度煎熟事招業之、驚撼西
黎國人口求簡有爲物、無勝武月日之因味旋猝、有實上此所益意人誠濟
大醫所進便丸散加安靈負絕失之弓有強居間致取上雖難以不恐、代
學學自散、散、以有之倫而論失目烈客不用味妙能口祇大能我設每
藥院自不致之或科本強數、與炮、中能領藥之否度圖受聞國再年以
以學研詰書實配公畢分、其餘者西醫下置立就應慮若修磨打問人既濟
士授者張事亂載之司失昭能炮、醫醫有阻服辦、多此、利駭大民人經濟、
葉藥也、以、味化之、招免相不藥料欲欲、兼服例、雖、者、利駭之、罔上國
山勁、不求中、以職相同在於九如欣囉不之如再日不、原經感之產
院陀、欺是藥成、繼病人血透過藥、使續煎類取我道間厥夫濟、損藥

電話 中央八八六二號

診所 上海浙江路北京路北首
洪德里四百七十八號

科 目 內科 外科 婦科 兒科 喉科 花柳

時間 上午八時至下午四時
時後出診 急病隨時請到

號 門診一元 出診四元 路遠
遞加貧病不計

金 方 丸 膏

門診開膏丸	方照門診例	加倍	出診開膏丸	方照出診例	加倍
一律遲一日	取方				

紹儀署

館址上海浙江路江蘇四里八十七號

定報價目

每三個月出一張
五個月一元全
年二元寄費在
內本埠一律
國外加倍郵票
代現九五計值

廣告價目

每期每格(計
五方寸)五元
均排於新聞之
旁如欲入新聞
中長期面議

調理

功吐汁痰實咽却
再服清火化痰

喉癆之症最忌
傷陰愈後調理
之法以陰養爲
第一要義如五

食厚味與前同

久服此丸	此丸能急	急
------	------	---

下盛者陰必虛壯
凉水之主以制陽
散光亦此症調理
之妙法也

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

11711111

(謝富蘭)

國歷節氣表
廢曆歷以後、國歷節氣、
一、殺人不易知道、茲

個人衛生、各有各的方法、不是說得太高、便是說得太泛了、據

我看來、祇有法國狄克博士的養生法、最切實而最易行的、所以要把他寫出來、

(一)住所衛生

住的地方要寬敞明亮

(二)起居衛生

早起早睡得益很大
節飲節食是延年
的祕訣

(三)胃腸衛生

保守清潔是却病的良法

(四)病毒衛生

睡眠要充足但過度是不好的

(五)睡眠衛生

空氣惡濁的地方不宜行深呼吸

(六)呼吸衛生

無論何時心境總要快樂

(七)精神衛生

研究學術須慢慢的前進

(八)學問衛生

選擇職業必須隨着自己的能力

(九)職業衛生

衣服不求華麗祇要保潔溫便於操作就好了

(十)衣服衛生

點醫林
怪病奇治

[illegible]

本報特聘羅家衡大律師爲常年法律顧問

分事務所法界麥賽爾蒂羅路寶康里五十六號
電話西五八二三號

八路克洛格界租法海上
印代局務印業勤號二十

今之藥者。每以僞藥欺人。上海
今日皆是。以致病家無從選擇。而其中以
遺精一藥爲尤甚。讀其廣告。毫無無比。購
而試之。效等於零。每使病家。有錢無處
買藥之痛苦。本丸經實地試驗。確具功效。
故敢問世。自發行以來。銷售一空。致後來
者。勢往狂前。抱憾深懷。願病家之要求。
第一批於前日到申。仍托上海浙江路北
京路北首洪園里李福報館代售。惟所製無
多。欲購從速。北平王德仁謹啓

育嬰常識(上)

(幸福社社員徐祝三)

(一) 嬰兒初生、口含血塊、此血其毒、急宜去之、免致吞下、
(二) 嬰兒初生、肛門常有薄膜、若生後經日不見大便、即係肛門
薄膜未裂、常人多能自裂、急宜用人功裂之、
(三) 嬰兒飲茶湯、不宜多攪糖類、每見人家要嬰兒飼茶灌湯、取其不
哭貪食、於茶湯中多攪糖類、(如紅糖白糖)不知糖能弱胃、能
損齒、又能致疾、故以少放糖爲宜、且一次用糖、下次即非糖
不可、是養成其嗜糖習慣、於脾胃殊不相宜、
(四) 嬰兒衣服、以質輕而柔軟者爲適宜、若毛糙粗硬、易致嬰兒啼
哭、
(五) 嬰兒抱在懷中、不宜口向嬰兒之面、冬季尤絕對避忌、因大人
吐痰氣甚多、口向嬰面、是不啻灌以炭氣、冬季呼氣成冷風、
故猶宜避忌、
(六) 嬰兒夜睡、爲母者、常擁之腋下、在蓋被天氣、大有妨害、蓋
深藏被中必致肺窒、或彈身出汗、
七 嬰兒須避狂吠哭響之猛烈聲、否則立即受驚、

汗出掛於膚風、或逼近於烈日之地、亦有因食時厚味太多、睡時多蓋衣被、邪熱鬱蒸於心、心傳於肝、加以外感驚觸、神氣承受載刺、故其病之發也、夜臥不甯、睡中或哭或笑、身熱煩燥、便秘溺赤、或痰喘喘、咬牙咬乳、忽爾間絕、目直牙閉、四肢播弱、面紅脈浮數洪緊、足趾內有實熱、外挾風邪、鬱蒸於心、心受熱而發驚、肝生風而發熱、二臟交爭、風火相搏、痰涎壅塞、關竅不通、風氣蓄盛於內、而無所

勞嗽多死于油

蕩論
(繆康壽)

小兒病之最危險者、莫若急驚、古方不載、但曰陽癇、然則其症何以成、蓋皆由保養失宜、有時

觀之、凡愛護小兒者、豈可不慎於平日間之飲食起居乎、

熟眠法之經驗談

(楊健民)

香燥、肺喜清潤、保肺則礙脾、補脾則礙肺、倘燥熱甚、能食而大便乾結者、調肺爲先、而補脾之藥、亦不可少、如虛羸甚、食之難受、雖清潤之品爲大戒、以脾爲急、而清潤之品爲大須、因脾有生肺之能、肺無助脾之力、故保脾之藥、猶重於保肺也、常見虛勞久嗽之死多死於便溲、而究其便溲之因、多由於誤投清潤之品、先哲有云、土旺而金生、勿拘拘於保肺、水壯而火熄、勿汲汲於清心、旨哉言乎、管窺之見、未識

人以不熟眠、必多幻夢、稍觸便覺、故雖眠臥八時、其結果與四時者等、且不睡則心慮煩亂精神日耗、而百病將因之而發生、其害之大、曷可勝言、數年前余有此患、雖嘗服安眠之藥、亦不過取效一時、及後幾至非服此藥不可、儼成習慣、由是身軀日趨衰弱、後因閱醫學叢書、有熟眠法一節、甚善、乃照法試行、不一月而此患霍然、一居之患、敢以實語諸君、

(一)居住宜擇閑靜之地、則五官不受外界刺激、易於安臥、

(二)寢室不宜過於溫暖、亦不可過於寒冷、總以常度稍冷爲適、室中空氣必須充足、早晨窗戶宜開、晚間亦不可全閉、庶空氣得以流通、

(三)被蓋不宜過重厚、取其不致冒寒可耳、褥厚無妨、軟者尤佳、

(四)晚餐食物、宜選絕刺激性食品、當取易消化者爲佳、然亦不可過量、飲食時間、常離就寢時三時之前、

(五)作事、宜適度爲之、每作事二時間、以休息二十分爲度、晚餐後或事務畢後、宜撥冗一二時間、爲諸種愉快之談話、以代償身心之疲勞、

(六)運動因人而異、總宜量力適度行之、或朝食前散步半時間、晚餐後約一時間、或演習八段錦甚佳、

小兒急驚之由

來
(黃玉麀)